

Relevés N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Altitude, m	300	400	500	520	520	550	550	550	580	580	600	600	620	650	650	680	680	780	800	800	990	1100	1100	1200	
Substrat	Q	Q	Q	F	F	Q	Q	Q	A	Q	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	Q	F	F	F	Fr
Espèces																									
M <i>Hypnum cupressiforme</i> ^a	2		4	1	2		4	+	3	3		3	3	2	2	+	4	2	3	1	4	1	2	3	
M <i>Neckera pumila</i>				4	3				2		5		5	3	4	5	3	3	5	5					
H <i>Metzgeria furcata</i>				2					3		+		1	1	3	3	+	2	3	3					
H <i>Frullania dilatata</i>	3	4		3		4		3	3	2		2		4				2							
H <i>Radula complanata</i>				3	+				1					3	3	1	+	1	1						
M <i>Antitrichia curtipendula</i>			4				4	4									1				3	4	5	4	
M <i>Orthotrichum lyellii</i>						4		2	3	4					2			2	2						
M <i>Pterigynandrum filiforme</i>															3	2	2	2		1					
M <i>Ulotia crispa</i>	1	2				1				1		2													
M <i>Isoetecium myurum</i>					4								2				3			3					
M <i>Leucodon sciuroides</i>													2		2	3							4		
M <i>Homalothecium sericeum</i>							1									1									
M <i>Orthotrichum leiocarpum</i>	1					+																			
M <i>Dicranum scoparium</i>																					3				
M <i>Drepanocladus uncinatus</i>																									
M <i>Orthotrichum stramineum</i>																					+				
M <i>Orthotrichum speciosum</i>																								+	
M <i>Brachythecium rutabulum</i>							+																		
M <i>Rhytidiadelphus loreus</i>																							2		
M <i>Bryum capillare</i>																							1		
H <i>Frullania tamarisci</i>																					1				
H <i>Microlejeunea ulicina</i>													3												
M <i>Neckera complanata</i>																				2					
M <i>Madotheca platyphylla</i>																1									
M <i>Orthotrichum sp.</i>														2											
Nombre d'espèces																									

^a ssp. *filiforme*

Les relevés ont été effectués sur des carrés de 4 dm², un par arbre, à 1,7–2,5 m du sol, sur des écorces de Hêtre (F : *Fagus sylvatica* L.), d'Érable sycomore (A : *Acer pseudoplatanus* L.) et de Chêne sessile [Q : *Quercus petraea* (Mattus.) Liebl.]. M : Mousse. H : Hépatique. Nomenclature des Bryophytes d'après Bertsch K., 1966, *Moosflora von Südwestdeutschland*, Ulmer, Stuttgart. Extrait, d'après Walter J.-M., 1975–1977, Groupements muscinaux dans les Vosges moyennes, *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Colmar* 56, 91–102, 15 tables. Les Lichens n'ont pas été inclus. Le Tableau comporte deux parties : le tableau écologique et le tableau floristique. Le tableau écologique contient deux variables, l'une quantitative (altitude), l'autre qualitative (espèce hôte) avec trois modalités (Q, F, A). Le tableau floristique liste les espèces et indique les coefficients d'abondance-dominance de Braun-Blanquet. Les espèces sont ordonnées suivant leur fréquence, les relevés suivant leur altitude et non suivant leur saisie sur le terrain. La dernière colonne est réservée aux fréquences, la dernière ligne aux nombres d'espèces par relevé. *Attention* : plusieurs espèces (*D. scoparium*, *D. uncinatus*, *B. rutabulum*, *R. loreus*, *Orthotrichum* sp.) n'ont pas été prises en compte dans les traitements du fichier <releve-02.pdf>. Par conséquent, ce tableau comporte 25 espèces et non 21 comme il est décrit dans <releve_02.pdf>.